

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО САМООЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПО НАЛИЧИЮ  
И ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ (СОСТОЯНИЙ), СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ  
ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

Курганская область

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают								
		в городских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек			в сельских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, человек			
			менее 50,0	50,0– 99,9	250,0- 499,9		до 200	201 - 1000	1001-5000	более 5000
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Все респонденты, за исключением детей в возрасте до 3 лет – всего	100.0	61.9	12.7	9.4	39.8	38.1	5.3	22.3	2.4	8.2
в том числе по самооценке состояния своего здоровья										
хорошее	100.0	69.3	10.3	7.7	51.4	30.7	2.2	20.4	0.4	7.6
удовлетворительное	100.0	57.9	12.0	11.8	34.2	42.1	7.0	22.0	3.7	9.4
плохое	100.0	57.7	20.9	5.2	31.5	42.3	6.6	27.4	2.9	5.4
Все респонденты, за исключением детей в возрасте до 3 лет – всего	100.0	61.9	12.7	9.4	39.8	38.1	5.3	22.3	2.4	8.2
в том числе										
имеют одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	100.0	57.3	15.3	9.7	32.3	42.7	6.7	23.4	2.6	10.0
из них имеют										
повышенное артериальное давление	100.0	60.5	18.1	9.6	32.7	39.5	5.7	23.6	3.5	6.8
диабет или повышенный сахар в крови	100.0	60.3	20.3	8.0	31.9	39.7	8.6	24.2	2.2	4.8
высокий уровень холестерина в крови	100.0	65.7	19.2	10.7	35.7	34.3	5.2	22.1	2.2	4.7
инфаркт миокарда	100.0	60.7	26.0	10.2	24.6	39.3	0.0	33.6	5.7	0.0
инсульт (нарушение мозгового кровообращения)	100.0	69.3	19.2	3.3	46.8	30.7	11.4	16.4	2.9	0.0
туберкулез	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	64.9	0.0	35.1	0.0
гепатит	100.0	42.5	5.2	8.1	29.2	57.5	0.0	34.1	0.0	23.4
сколиоз (искривление позвоночника)	100.0	54.3	9.4	16.0	28.9	45.7	2.1	24.3	1.2	18.1
остеопороз	100.0	83.7	24.8	5.9	53.0	16.3	1.4	6.9	0.0	7.9



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
низкий уровень гемоглобина или анемия	100.0	48.8	8.9	6.5	33.5	51.2	3.3	30.2	0.0	17.7
заболевание желудочно-кишечного тракта	100.0	48.1	16.1	8.8	23.3	51.9	6.2	29.5	1.3	14.9
онкологическое заболевание	100.0	60.5	14.1	0.0	46.4	39.5	7.8	21.2	3.7	6.9
аллергия на пищевые продукты	100.0	64.4	21.7	11.2	31.6	35.6	11.1	14.9	0.0	9.5
переломы длинных трубчатых костей рук или ног (за последний год)	100.0	94.3	27.8	23.5	43.1	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0
другое хроническое заболевание	100.0	23.7	23.7	0.0	0.0	76.3	0.0	76.3	0.0	0.0
не имеют перечисленных заболеваний (состояний)	100.0	67.3	9.5	8.8	49.1	32.7	3.7	20.9	2.3	5.7
Все респонденты (за исключением детей в возрасте до 3 лет), имеющие одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	100.0	57.1	15.1	9.4	32.6	42.9	6.4	23.9	2.5	10.1
в том числе по числу заболеваний (состояний), связанных с питанием										
имеют одно заболевание (состояние)	100.0	59.7	12.7	11.6	35.4	40.3	7.3	19.5	3.2	10.3
имеют два и более заболевания (состояния)	100.0	55.0	18.2	8.2	28.6	45.0	6.0	26.9	1.9	10.2



	Все респонденты	в том числе проживают								
		в городских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек			в сельских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, человек			
			менее 50,0	50,0– 99,9	250,0- 499,9		до 200	201 - 1000	1001-5000	более 5000
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Все респонденты, за исключением детей в возрасте до 3 лет – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе по самооценке состояния своего здоровья										
хорошее	35.1	39.3	28.5	28.7	45.3	28.3	14.6	32.2	6.1	32.7
удовлетворительное	50.1	46.9	47.2	62.9	43.0	55.3	66.8	49.5	76.1	57.6
плохое	14.8	13.8	24.3	8.3	11.7	16.4	18.6	18.2	17.7	9.7
Все респонденты, за исключением детей в возрасте до 3 лет – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе										
имеют одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	50.7	47.0	60.8	52.9	41.2	56.9	64.4	53.3	55.4	62.2
из них имеют										
повышенное артериальное давление	34.2	33.4	48.7	35.2	28.1	35.5	36.7	36.2	49.5	28.6
диабет или повышенный сахар в крови	5.7	5.5	9.0	4.8	4.5	5.9	9.3	6.1	5.1	3.3
высокий уровень холестерина в крови	13.2	14.0	19.9	15.2	11.9	11.9	13.2	13.2	12.3	7.7
инфаркт миокарда	2.2	2.1	4.5	2.4	1.3	2.3	0.0	3.3	5.2	0.0
инсульт (нарушение мозгового кровотока)	2.6	2.9	4.0	0.9	3.1	2.1	5.7	1.9	3.1	0.0
туберкулез	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.4	0.0	2.9	0.0
гепатит	2.1	1.5	0.9	1.8	1.6	3.2	0.0	3.3	0.0	6.1
сколиоз (искривление позвоночника)	6.1	5.4	4.5	10.5	4.5	7.4	2.5	6.7	3.0	13.6
остеопороз	2.9	4.0	5.7	1.9	3.9	1.3	0.8	0.9	0.0	2.8
низкий уровень гемоглобина или анемия	9.3	7.4	6.5	6.5	7.8	12.5	5.8	12.6	0.0	20.2
заболевание желудочно-кишечного тракта	17.0	13.2	21.4	16.0	9.9	23.1	19.9	22.5	9.2	30.8
онкологическое заболевание	1.9	1.9	2.1	0.0	2.2	2.0	2.8	1.8	2.9	1.6
аллергия на пищевые продукты	6.1	6.3	10.3	7.3	4.8	5.7	12.9	4.1	0.0	7.1



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переломы длинных трубчатых костей рук или ног (за последний год)	1.0	1.6	2.2	2.6	1.1	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0
другое хроническое заболевание	0.5	0.2	1.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.8	0.0	0.0
не имеют перечисленных заболеваний (состояний)	37.2	40.9	26.2	36.8	46.5	31.2	35.6	32.1	39.5	23.5
Все респонденты (за исключением детей в возрасте до 3 лет), имеющие одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе по числу заболеваний (состояний), связанных с питанием										
имеют одно заболевание (состояние)	49.5	51.6	41.6	61.0	53.6	46.7	55.8	41.0	61.4	50.5
имеют два и более заболевания (состояния)	53.0	51.0	64.0	46.1	46.4	55.8	48.7	60.5	38.6	53.5