

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И БОЛЕЕ
ПО АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И УРОВНЮ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

Курганская область

в процентах

| | Все респонденты | в том числе проживают | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--|------------|--------------|--|--|------------|-----------|------------|
| | | в городских населенных пунктах - всего | в т.ч. с численностью населения, тыс. человек | | | в сельских населенных пунктах - всего | в т.ч. с численностью населения, человек | | | |
| | | | менее 50,0 | 50,0– 99,9 | 250,0- 499,9 | | до 200 | 201 - 1000 | 1001-5000 | более 5000 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Лица в возрасте 14-18 лет - всего | 100.0 | 68.7 | 9.8 | 17.1 | 41.8 | 31.3 | 2.4 | 21.1 | 1.1 | 6.7 |
| в том числе по Z-скор индекса массы тела | | | | | | | | | | |
| худощавость (< -2) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| норма (-2, +1) | 100.0 | 68.9 | 9.9 | 17.8 | 41.2 | 31.1 | 2.7 | 23.4 | 1.3 | 3.8 |
| избыточная масса тела, включая ожирение (> +1) | 100.0 | 53.3 | 0.0 | 18.5 | 34.8 | 46.7 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 37.7 |
| ожирение (> +2) | -* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| выраженное ожирение (> +3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| не определено | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Лица в возрасте от 19 лет и более - всего | 100.0 | 61.4 | 12.5 | 8.6 | 40.2 | 38.6 | 6.2 | 22.0 | 2.8 | 7.7 |
| в том числе по индексу массы тела | | | | | | | | | | |
| недостаточная (дефицит) масса тела (16-18,5) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| норма (18,5-25) | 100.0 | 60.7 | 11.3 | 5.1 | 44.3 | 39.3 | 5.2 | 24.1 | 2.1 | 8.0 |
| избыточная масса тела (предожирение) (25-30) | 100.0 | 62.6 | 12.4 | 12.1 | 38.1 | 37.4 | 5.9 | 18.7 | 2.1 | 10.7 |
| ожирение первой степени (30-35) | 100.0 | 61.4 | 8.5 | 11.0 | 41.9 | 38.6 | 7.4 | 22.1 | 4.4 | 4.7 |
| ожирение второй степени (35-40) | 100.0 | 54.6 | 24.1 | 8.4 | 22.1 | 45.4 | 11.8 | 24.4 | 6.7 | 2.5 |
| ожирение третьей степени (морбидное) (40 и более) | 100.0 | 51.0 | 23.2 | 2.8 | 25.0 | 49.0 | 5.0 | 39.0 | 1.3 | 3.7 |
| не определено | 100.0 | 75.6 | 23.7 | 0.0 | 52.0 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 |
| Все респонденты в возрасте 14 лет и более | 100.0 | 61.9 | 12.3 | 9.3 | 40.3 | 38.1 | 5.9 | 21.9 | 2.6 | 7.6 |
| в том числе по энергетической деятельности (коэффициенту физической активности) | | | | | | | | | | |
| легкая степень, малоподвижность КФА 1,0-1,4 | 100.0 | 71.2 | 32.1 | 0.0 | 39.1 | 28.8 | 3.2 | 25.6 | 0.0 | 0.0 |
| средняя степень активности КФА 1,4-1,8 | 100.0 | 76.4 | 14.3 | 10.0 | 52.1 | 23.6 | 2.9 | 11.2 | 3.7 | 5.8 |
| высокая степень активности КФА >1,8 | 100.0 | 51.2 | 10.4 | 9.0 | 31.8 | 48.8 | 8.1 | 29.5 | 1.9 | 9.1 |

* Здесь и далее - отметка « - » (тире) означает отсутствие ответов респондентов (наблюдений) по данному показателю.

| | Все респонденты | в том числе проживают | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--|------------|--------------|--|--|------------|-----------|------------|
| | | в городских населенных пунктах - всего | в т.ч. с численностью населения, тыс. человек | | | в сельских населенных пунктах - всего | в т.ч. с численностью населения, человек | | | |
| | | | менее 50,0 | 50,0– 99,9 | 250,0- 499,9 | | до 200 | 201 - 1000 | 1001-5000 | более 5000 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Лица в возрасте 14-18 лет - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе по Z-скор индекса массы тела | | | | | | | | | | |
| худощавость (< -2) | 2.8 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| норма (-2, +1) | 86.7 | 86.9 | 87.2 | 90.1 | 85.5 | 86.3 | 100.0 | 96.1 | 100.0 | 48.5 |
| избыточная масса тела, включая ожирение (> +1) | 9.2 | 7.1 | 0.0 | 9.9 | 7.7 | 13.7 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 51.5 |
| ожирение (> +2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| выраженное ожирение (> +3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| не определено | 1.3 | 1.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Лица в возрасте от 19 лет и более - всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе по индексу массы тела | | | | | | | | | | |
| недостаточная (дефицит) масса тела (16-18,5) | 1.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| норма (18,5-25) | 31.7 | 31.4 | 28.6 | 18.7 | 34.9 | 32.3 | 26.6 | 34.8 | 23.6 | 32.9 |
| избыточная масса тела (предожирение) (25-30) | 34.3 | 35.0 | 33.8 | 48.0 | 32.5 | 33.2 | 32.7 | 29.2 | 25.6 | 47.7 |
| ожирение первой степени (30-35) | 19.3 | 19.3 | 13.0 | 24.5 | 20.1 | 19.3 | 22.9 | 19.5 | 30.8 | 11.8 |
| ожирение второй степени (35-40) | 7.3 | 6.5 | 14.1 | 7.1 | 4.0 | 8.6 | 13.9 | 8.1 | 17.8 | 2.3 |
| ожирение третьей степени (морбидное) (40 и более) | 4.7 | 3.9 | 8.8 | 1.5 | 2.9 | 6.0 | 3.8 | 8.4 | 2.2 | 2.3 |
| не определено | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Все респонденты в возрасте 14 лет и более | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| в том числе по энергетической деятельности (коэффициенту физической активности) | | | | | | | | | | |
| легкая степень, малоподвижность КФА 1,0-1,4 | 1.5 | 1.7 | 3.8 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| средняя степень активности КФА 1,4-1,8 | 41.4 | 51.1 | 48.0 | 44.5 | 53.5 | 25.7 | 20.6 | 21.3 | 58.0 | 31.5 |
| высокая степень активности КФА >1,8 | 57.1 | 47.3 | 48.2 | 55.5 | 45.1 | 73.2 | 78.6 | 77.1 | 42.0 | 68.5 |