

Таблица 5.4

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО НАЛИЧИЮ И ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ (СОСТОЯНИЙ),  
СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ  
ПО ИНДЕКСУ МАССЫ ТЕЛА (ПО ПИЩЕВОМУ СТАТУСУ)**

Курганская область

в процентах

|   | Все респонденты в<br>возрасте 19 лет и<br>более | в том числе по индексу массы тела     |   |   |
|---|---|---------------------------------------|---|---|
|   |   | Норма и менее<br>нормы<br>(18,5—24,9) | Избыточная масса<br>тела<br>(предожирение)<br>(25-29,9) | Ожирение первой<br>степени<br>(30-34,9) |
| Все респонденты в возрасте 19 лет и более – всего   | 100.0   | 100.0                                 | 100.0   | 100.0                                   |
| в том числе   |   |                                       |   |   |
| имеют одно или несколько заболеваний (состояний),<br>связанных с питанием – всего                   | 63.6  | 53.6                                  | 60.6  | 80.4                                    |
| из них имеют  |   |                                       |   |   |
| повышенное артериальное давление – всего  | 44.0  | 24.5                                  | 44.2  | 66.1                                    |
| из них за последние 2 недели принимали<br>лекарства по поводу повышенного артериального<br>давления | 33.8  | 19.7                                  | 33.6  | 49.0                                    |
| диабет или повышенный сахар в крови   | 6.3   | 2.5                                   | 4.9   | 12.5                                    |
| из них принимают лекарства по поводу диабета  | 4.9   | 1.9                                   | 3.2   | 10.2                                    |
| высокий уровень холестерина в крови   | 9.2   | 4.4                                   | 8.7   | 15.6                                    |
| инфаркт миокарда  | 2.7   | 0.7                                   | 2.3   | 7.6                                     |
| инсульт (нарушение мозгового кровообращения)  | 3.0   | 1.7                                   | 3.0   | 5.5                                     |
| туберкулез  | 0.7   | 1.5                                   | 0.3   | 0.0                                     |
| гепатит   | 1.6   | 0.5                                   | 0.4   | 3.3                                     |
| остеопороз  | 2.7   | 1.7                                   | 3.0   | 3.7                                     |
| низкий уровень гемоглобина или анемия   | 11.8  | 18.1                                  | 7.9   | 9.9                                     |
| сколиоз (искривление позвоночника)  | 0.0   | 0.0                                   | 0.0   | 0.0                                     |
| заболевание желудочно-кишечного тракта  | 24.0  | 26.2                                  | 22.3  | 23.4                                    |
| аллергия на пищевые продукты  | 6.2   | 6.7                                   | 4.6   | 8.0                                     |
| переломы длинных трубчатых костей рук или ног (за<br>последний год)                                 | 1.6   | 1.8                                   | 1.3   | 1.8                                     |

|   | Все респонденты в<br>возрасте 19 лет и<br>более | в том числе по индексу массы тела     |   |   |
|---|---|---------------------------------------|---|---|
|   |   | Норма и менее<br>нормы<br>(18,5—24,9) | Избыточная масса<br>тела<br>(предожирение)<br>(25-29,9) | Ожирение первой<br>степени<br>(30-34,9) |
| не имеют перечисленных заболеваний (состояний)  | 36.4  | 46.4                                  | 39.4  | 19.6                                    |
| Все респонденты в возрасте 19 лет и более, имеющие одно<br>или несколько заболеваний (состояний), связанных с<br>питанием – всего | 100.0   | 100.0                                 | 100.0   | 100.0                                   |
| в том числе по числу заболеваний (состояний),<br>связанных с питанием   |   |                                       |   |   |
| имеют одно заболевание (состояние)  | 53.9  | 58.1                                  | 56.9  | 48.1                                    |
| имеют два и более заболевания (состояния)   | 46.1  | 41.9                                  | 43.1  | 51.9                                    |